

หากมีอาการดังต่อไปนี้ กรุณาแจ้งแพทย์  
ก่อนได้รับวัคซีน

- ✓ ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- ✓ มีไข้สูง และ ไม่สบายหรือมี  
การเจ็บป่วยอื่นๆ ก่อนได้รับ  
วัคซีน
- ✓ เคยมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงจาก  
การได้วัคซีนมาก่อน เช่น หายใจ  
ไม่อิ่ม บวม หายใจเสียงดังคล้าย  
นกหวีด เป็นต้น

หากมีอาการดังต่อไปนี้หลังรับวัคซีน  
รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที

- ✓ หายใจไม่อิ่ม หายใจลำบาก  
หายใจมีเสียงนกหวีด
- ✓ บวมบริเวณใบหน้าเปลือกตา ลิ้น  
ริมฝีปาก
- ✓ มีผื่นลมพิษ คัน และผื่นผิวหนัง  
ต่างๆ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีขอ  
มอบความปรารถนาดีด้วย

ราคาเหมาจ่าย

โปรแกรมตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนป้องกัน  
ไวรัสตับอักเสบนชนิด เอ 2 เข็ม

- ✓ ตรวจ Anti-HAV
- ✓ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบนชนิด  
เอ 2 เข็ม  
(ระยะเวลาที่ฉีดที่ 0 และ 6 เดือน)

ราคารวม  
3,156 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
แผนกผู้ป่วยนอก โทร. 036-621-800

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส  
ตับอักเสบนชนิด เอ



ด้วยความปรารถนาดีจาก  
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี



## ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (Hepatitis A)

โรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถติดต่อ ผ่านทางปากจากการกิน ดื่ม หรือ การสัมผัสทางปาก โดยเชื้อปนเปื้อนในอุจจาระของผู้ป่วย ในอาหาร น้ำ ดื่ม มือ และเครื่องใช้ต่างๆ อาจติดต่อโดยการกินอาหารสด หรือปรุงสุกๆดิบๆ น้ำดื่มไม่สะอาด และจากการสัมผัสอุจจาระของผู้ป่วยโดยตรงจากการดูแลหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย

### Human pathogen transmission



คุณรู้หรือไม่ว่า



ไวรัสตับอักเสบชนิดเอโดยทั่วไปไม่รุนแรงผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวกลับเป็นปกติได้เองและเมื่อติดเชื้อครั้งหนึ่งแล้วมักมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต

**“แต่ไวรัสตับอักเสบชนิดเอถึง ร้อยละ 10มีอาการรุนแรงจนจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจเสียชีวิตจากภาวะตับวายได้”**

คุณสามารถป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอได้โดยการรักษาสุขอนามัย กินอาหารที่ปรุงสุก ดื่มน้ำที่สะอาด และการฉีดวัคซีนป้องกัน



### วิธีการให้วัคซีน

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดย ฉีดเข็มแรก ฉีดในวันที่ 0 หลังจากนั้นอีก 6 เดือนฉีดเข็มที่สอง

### หากลืมไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

สามารถไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองได้ทันทีที่ไม่ต้องมีการฉีดเข็มที่หนึ่งใหม่อีกรอบ

### การตรวจติดตามผล

จะตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อ เชื้อ(แอนติบอดี)โดยดูจากค่า Anti -HAV

### อาการข้างเคียงที่พบได้หลังฉีดวัคซีน

ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีดวัคซีน, ไข้ต่ำๆ, ปวดหัว, อ่อนเพลีย, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้

