



ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก
ของผู้ป่วยกลุ่ม ASC โดยการตรวจ
คัดกรองด้วยวิธี Pap smear
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

❁ นิชาภัทร มะโนแจ่ม ❁

ชื่อเรื่อง : ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกของผู้ป่วยกลุ่ม ASC โดยการตรวจคัดกรองด้วยวิธี
Pap smear โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ผู้วิจัย : ณิชภัทร มะโนแจ่ม

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกของผู้ป่วยกลุ่ม ASC โดยการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Pap smear โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกของผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองวิธี Pap smear เป็น ASC-US และ ASC-H กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผลการตรวจคัดกรองปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear ของผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเป็น ASC-US และ ASC-H ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ที่มีผลการตรวจทางพยาธิวิทยาจำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Pap smear เป็น ASC-US และ ASC-H และผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ สถิติฟิชเชอร์ (Fisher's exact test)

ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธี Pap smear กลุ่ม ASC มีจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 -59 ปี ร้อยละ 28.2 และมีอายุเฉลี่ย 50.42 ปี จำนวนการคลอดบุตรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน และมีจำนวนบุตรส่วนใหญ่ 2 คน ร้อยละ 39.7 ผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของผู้ป่วยกลุ่ม ASC-US ส่วนใหญ่มีผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเป็นปกติ ร้อยละ 73.2 และพบผลการตรวจเป็น Carcinoma ร้อยละ 7.3 ส่วนผู้ป่วยกลุ่ม ASC-H ส่วนใหญ่มีผลการตรวจทางพยาธิวิทยาเป็น HSIL ร้อยละ 43.2 และพบผลการตรวจเป็น Carcinoma ร้อยละ 13.5

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ Pap smear เป็นชนิด ASC-H มีโอกาสเสี่ยงเป็นระยะก่อนมะเร็งและมะเร็งปากมดลูกสูง จึงควรได้รับการตรวจติดตามและยืนยันการวินิจฉัยให้เร็วขึ้น